

Mat-1.414 Matematiikan peruskurssi V2 kevät 2002

<http://www.math.hut.fi/teaching/v/3/H/>

Laskuharjoitus 10 (viikko 15 , 10–12.4.2002)

Alkuviikko (AV)

1. Laske kappaleen tilavuus, jota rajoittavat yläpuolelta pinta $z = xy^2 + y^3$ ja alapuolelta xy -tason neliö $R = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2, 1 \leq y \leq 3\}$

2. Laske integraali

$$\int_A (xy + y^2) da,$$

missä A on kolmio, jonka kärjet ovat pisteissä $(1, 0), (0, 1), (-1, 0)$.

3. Laske $\int \int_A \ln x da$, missä A on suoran $2x + 2y = 5$ ja hyperbelin $xy = 1$ rajoittama alue.
4. Laske integraali

$$\int_0^4 dy \int_{y/2}^{\sqrt{y}} e^{y/x} dx.$$

Vihje: Integrointi tyssää heti alkuunsa, vai mitä! Ainoaksi toivon kipinäksi jää kokeilla integrointijärjestyksen vaihtamista. No kokeile, niin huomaat oikein laskien päätyväsi tulokseen $e^2 - 1$.

5. Määritä napakoordinaateissa annetun lemniskaatan $r^2 = 4 \cos 2\Theta$ sisään jäävän alueen pinta-ala.

Vihje: Kun asiaa tutkaillet, huomaat, että kyseessä on ∞ :n näköinen silmukka, jonka alan saat kertomalla 2:lla alueen, joka piirtyy, kun $\Theta \in \{-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\}$

6. Määritä paraboloidien $z = x^2 + y^2$ ja $3z = 4 - x^2 - y^2$ rajoittaman kappaleen tilavuus. Piirrä myös kuva. Kannattaa käyttää napakoordinaatteja.

Ohjeita

Pinta-alkioiden muuntosuhde siirryttäessä napakoordinaatistoon:

$$dx dy = r dr d\Theta.$$

Loppuviikko (LV)

LV-tehtävissä kannattaa periaate miettiä etukäteen, integrointitekniikan voi pääsääntöisesti jättää Maplen huoleksi.

Piirto-ym. ohjeita: `H/harj10ohje.mws`

1. Laske sopivan muuttujanvaihdon avulla integraali

$$\int_D (2x + 3y)^2 (x - 5y)^2 dx dy,$$

missä $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |2x + 3y| \leq 4, |x - 5y| \leq 3\}$.

2. Laske $\int x dV$ yli tetraedrin, jota rajoittavat koordinaattitasot ja taso $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$.
3. Osoita laskemalla muunnoksen Jakobin determinantti, että pallokoordinaateissa lausuttu tilavuusalkio on

$$dV = \rho^2 \sin \phi d\Theta d\phi d\rho.$$

4. Määritä kartion $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ja pallon $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ sisään jäävän, xy -tason yläpuolella olevan ”jätskitötterön” tilavuus.

Laske sekä (a) sylinteri- että (b) pallokoordinaateissa.

Piirrä kuva Maplalla. (`H/harj10ohje.mws`)

5. (a) Määritä kuution $[0, a] \times [0, a] \times [0, a]$ massakeskipiste, kun tiheys $\rho(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$.

(b) Määritä Pallon $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 1. oktantin $x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$ geometrinen keskipiste (”centroid”).

6. Laske ja havainnollista luentotehtävä(ä) pallon $x^2 + y^2 + z^2 = 4a^2$ ja lieriön $x^2 + y^2 = 2ay$ sisään jäävän alueen tilavuudesta.

Käytä integrointiin Maplea ja tietysti piirtoon. Yksityiskohtaisia ohjeita tiedostossa `H/harj10ohje.mws`.

Ohjeita

Pallokoordinaatit

$$\begin{cases} x = \rho \sin \phi \cos \Theta \\ y = \rho \sin \phi \sin \Theta \\ z = \rho \cos \phi \end{cases}$$

Momentteja, massakeskipisteitä

Olkoon kappaleen D tiheys paikasta riippuva: $\rho(x, y, z)$. *Momentti* tason $x = x_0$ suhteen:

$$M_{x=x_0} = \int_D (x - x_0)\rho(x, y, z)dV = M_{x=0} - x_0m,$$

missä m on kappaleen D massa (m :n integraalikaavan osaat kirjoittaa itse).

Vastaavasti määritellään momentit $M_{y=y_0}$ ja $M_{z=z_0}$.

Massakeskipiste on sellainen piste $p_0 = (x_0, y_0, z_0)$, jonka suhteen lasketut momentit $M_{x=x_0}$, $M_{y=y_0}$ ja $M_{z=z_0}$ ovat nollia. Ts. $x_0 = \frac{M_{x=0}}{m}$, $y_0 = \frac{M_{y=0}}{m}$, $z_0 = \frac{M_{z=0}}{m}$.

Keskiö, eli *geometrinen keskipiste* on homogeenisen kappaleen (tiheys=vakio) massakeskipiste. Se siis saadaan asettamalla vaikka $\rho = 1$ yllä.