

# Mat-1.415 Matematiikan peruskurssi V3, s 2000

Apiola

## 3. välikoe 14.12. 2000

Kirjoita selvästi jokaiseen koepaperiin eri riveille:

- 1) opintojakson nimi, päiväys;
- 2) Nimi kokonaisuudessaan, opiskelijanumero+kirjain,
- 3) koulutusohjelma
- 4) nimikirjoitus.

1. Muodosta funktion  $f(t) = |\sin t|$  Fourier-sarja. Piirrä  $f$ :n kuvaaja välillä  $[-\pi, \pi]$  ja hahmottele sarjan osasumman  $s_1$  kuvaaja samalla välillä. Osasumma  $s_1$  koostuu termeistä, joiden indeksit ovat  $-1, 0, 1$ , kun käytetään kompleksista esitysmuotoa.

Evästyksiksi:

- Laskutyön voi minimoida käyttämällä kompleksimuotoista esitystä. Kannattaa myös miettiä, mikä on funktion jakso.
- Hahmottelua varten riittää laskea osasumman arvot vaikkapa pisteissä  $t = 0$  ja  $t = \pi/2$  ja hyödyntää jaksollisuutta.)

2. **Huom!** Tämä tehtävä ei sisällä varsinaisesti yhtään laskentaa, älä tuhlaa aikaasi integrointitekniikkaan.

Olkoon  $f(t) = t$ , kun  $t \in [0, 1]$ .

- a) Piirrä  $f$ :n parillisen laajennuksen  $f_e$  ja parittoman laajennuksen  $f_o$  jaksolliset laajennukset (jaksona 2) välillä  $[-2, 2]$ . (Alaindeksit  $e$  ja  $o$  viittavat sanoihin "even" ja "odd".)
- b) Mitä termejä esiintyy  $f_e$ :n ja  $f_o$ :n reaali- ja imaginaaliosissa Fourier-sarjoissa? Perustelu parillisuus/parittomuus-päätelyllä.

c) Selvitä kummankin sarjan suppeneminen: Missä pisteissä sarja suppenee kohti funktion arvoa ja missä (jos missään) jotain muuta ja mitä silloin?

d) Selvitä, mitä tarkoittaa *Gibbsin ilmiö*, ja esiintyykö se jommassa kummassa (tai mahd. molemmissa) tapauksissa jossain kohdassa.

3. a) Laske  $\mathcal{F}\chi_{[0,T]}$  Voit käyttää hyväksesi  $t$ -siirtolausetta ja yhteyttä  $\chi_{[0,T]}(t) = \chi_{[-\frac{T}{2}, \frac{T}{2]}(t - \frac{T}{2})$  sekä alla annettua F-muunnoskaavaa.

b) Laske "ikkunoidun" kosinifunktion  $f(t) = \chi_{[0,T]} \cos \omega_0 t$  Fourier-muunnos.

4. Jonon  $(g_n)$  diskreetti Fourier-muunnos määritellään kaavalla

$$G_k = \sum_{n=0}^{N-1} a_{kn} g_n, \quad n = 0, 1, \dots,$$

missä  $a_{kn} = e^{-i2\pi kn/N}$ .

Merkitään  $A = (a_{kn})_{k,n=0}^{N-1}$ . Osoita, että  $A\bar{A} = NI$ , missä  $\bar{A}$  tarkoittaa konjugoitua matriisiä  $(\bar{a}_{kn})$  ja  $I$  on  $N \times N$  yksikkömatriisi.

Tämän perusteella saat  $A^{-1}$ :n, jonka avulla saat käänteismuunnoskaavan. Kirjoitapa se!

Vihje: Kirjoita matriisitulon alkio  $(A\bar{A})_{nk}$  ja erittele tapaukset  $n = k$  (päälävistäjä) ja  $n \neq k$ . Jälkimmäisessä voit menestyksellään hyödyntää geometrisen jonon summan kaavaa. (Jos et muista, niin osaathan johtaa sen käden käänteessä: merkitään  $s_N = 1 + q + q^2 + \dots + q^{N-1}$ ,  $qs_N = \dots$ ) Luennolla esiintyi matriisi  $A^H$ , mutta transponointi on selvästi tarpeetonta.

(Kaavoja kääntöpuolella)

## Fourier-kaavoja

### T-jaksoisen funktion Fourier-sarja

**Reaalimuoto** Olkoon  $f$  T-jaksoinen reaalifunktio, missä  $T = \frac{2\pi}{\omega}$ .  $f$ :n Fourier-sarjaesitys:

$f(t) = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\omega t + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\omega t$ , missä

$$a_n = \frac{2}{T} \int_d^{d+T} f(t) \cos n\omega t dt, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_d^{d+T} f(t) \sin n\omega t dt, \quad n = 1, 2, \dots$$

**Kompleksimuoto**  $f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{in\omega t}$ , missä

$$c_n = \frac{1}{T} \int_d^{d+T} f(t) e^{-in\omega t} dt, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

### Fourier-muunnokset

**Määritelmä:** Annettu  $f(t)$ ,  $\mathcal{F}f = F$ ,  $F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt$ .  
Käänteismuunnoskaava:  $f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{i\omega t} d\omega$ .

**Siirtolauseet** Olkoon  $\mathcal{F}f = F$ .

**t-siirto** :  $\mathcal{F}\{f(t-a)\} = e^{-i\omega a} F(\omega)$

**$\omega$ -siirto** :  $\mathcal{F}\{e^{i\omega_0 t} f(t)\} = F(\omega - \omega_0)$

**Eräitä funktioita ja Fourier-muunnoksia**  $\chi_{[a,b]}$  tarkoittaa välin  $[a, b]$  karakteristista funktiota, eli  $\chi_{[a,b]}(t) = H(t-a) - H(t-b)$ , missä  $H$  on Heavisiden funktio.

$$\text{sinc}(t) = \begin{cases} \frac{\sin t}{t}, & t \neq 0 \\ 1, & t = 0 \end{cases}$$

(Huom: Ei vakiintunut, kirjallisuudessa esiintyy modifioituja muotoja.)

$$\mathcal{F}\chi_{[-T,T]} = \omega \mapsto 2T \text{sinc}(\omega T).$$

**Yleishyödyllisiä kaavoja** Eulerin kaava (eräs monista):

$$e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi$$

## Ratkaisuja

Tehtävien 1 ja 2 ratkaisut: ../KOE/ratk3vkteht1.2.mws

**Teht. 3** a)

Merk.  $g(t) = \chi_{[-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}]}$ ,  $f(t) = \chi_{[0,T]}(t)$ , jolloin  $f(t) = g(t - \frac{T}{2})$ .

**t-siirto** :  $\mathcal{F}f = \mathcal{F}\{g(t - \frac{T}{2})\} = e^{-i\omega \frac{T}{2}} G(\omega)$ , missä

$$G(\omega) = (\mathcal{F}g)(\omega) = T \text{sinc}(\frac{\omega T}{2}).$$

$$\text{Siis: } \mathcal{F}f = \omega \mapsto T e^{-i\omega \frac{T}{2}} \text{sinc}(\frac{\omega T}{2})$$

Voidaan kirjoittaa monenlaisiin muotoihin käyttämällä Eulerin kaavaa, sinc:n määritelmää ym, mutta tästä eivät muodot varmasti lyhene.

b)

Merkitään nyt  $g$ :llä a)-kohdan  $f$ :ää, eli  $g = \chi_{[0,T]}$ . Siis  $G = \mathcal{F}g = \omega \mapsto T e^{-i\omega \frac{T}{2}} \text{sinc}(\frac{\omega T}{2})$ .

Tehtävänä on Fourier-muuntaa  $f(t) = g(t) \cos(\omega_0 t)$ .

Kirjoitetaan  $\cos(\omega_0 t) = \frac{1}{2}(e^{i\omega_0 t} + e^{-i\omega_0 t})$ , jolloin  $f(t) = \frac{1}{2}(e^{i\omega_0 t} g(t) + e^{-i\omega_0 t} g(t))$ .

$\omega$ -siirto :  $\mathcal{F}\{e^{i\omega_0 t} g(t)\} = G(\omega - \omega_0)$ , joten

$$\begin{aligned} F(\omega) &= (\mathcal{F}f)(\omega) = \frac{1}{2}(G(\omega - \omega_0) + G(\omega + \omega_0)) = \\ &= \frac{1}{2}(T[e^{-i\omega \frac{T}{2}} \text{sinc}(\frac{\omega T}{2})]_{\omega \rightarrow \omega - \omega_0} + T[e^{-i\omega \frac{T}{2}} \text{sinc}(\frac{\omega T}{2})]_{\omega \rightarrow \omega + \omega_0}) = \dots = \\ &= \frac{T}{2} e^{-i\omega \frac{T}{2}} (e^{i\omega_0 \frac{T}{2}} \text{sinc}(\frac{(\omega - \omega_0)T}{2}) + e^{-i\omega_0 \frac{T}{2}} \text{sinc}(\frac{(\omega + \omega_0)T}{2})) . \end{aligned}$$

**Teht. 4** Ratkaisu on luentoprujuissa.